



Dosaggio Massimo

Septanest con adrenalina 1/100 000	Adulti Non superare l'equivalente di 7 mg di artocaina cloridrato per chilogramma di peso corporeo.
Septanest con adrenalina 1/200 000	Bambini Non superare la dose di 2 ml durante l'intervento e la dose di 5 ml nelle 24 ore.
Scandonest 2% con adrenalina	Adulti 1 o 3 tubofiale de 1,8 ml per intervento, in funzione dell'estensione della zona da anestetizzare e della tecnica di iniezione utilizzata. Non superare in alcun caso la dose di 300 mg di mepivacaina per seduta.
Scandonest 3% senza vasocostrittore	Bambini La dose massima espressa in mg di mepivacaina HCl somministrabile al bambino può essere calcolata come segue: peso bambino (kg) x 1,33.

Xylonor 2% Special	Adulti Nei casi correnti: 3/4 di tubofiala sono sufficienti per ottenere una buona anestesia, sempre che l'iniezione sia fatta nel punto voluto. Nei casi più complicati è sufficiente una tubofiala e mezzo.
	Bambini La dose raccomandata in mg di lidocaina cloridrato che può essere somministrata nei bambini può essere calcolata dall'espressione: peso del bambino (in kilogrammi) x 1,33. Non eccedere la dose di 2,2 mg di lidocaina per kilogrammo di peso corporeo.