


Anestesia locale

Optocain



L'anestetico locale caratterizzato da elevata stabilità e da un'azione più rapida e più prolungata. L'effetto anestetizzante rapido e profondo la rende adatta per qualsiasi tipo di intervento in odontostomatologia. Tempo di induzione breve (1-2' per anestesi di superficie e 3-5' per anestesie di conduzione).

Scarsa incidenza di effetti collaterali e, data la struttura amidica, rare probabilità di reazione allergiche.

Optocain non contiene conservanti tipo Paraben.

	Confezioni	Indicazioni terapeutiche
Optocain 30 mg/ml soluzione iniettabile	50 cartucce da 1,8 ml	Per interventi di normale routine e nei casi in cui la somministrazione del vasocostrittore è controindicata
Optocain 20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000	50 cartucce da 1,8 ml	Per interventi di media e lunga durata, nella pratica e nei casi in cui è conveniente ridurre le concentrazioni plasmatiche dell'anestetico locale (bambini, anziani, ecc.).
Optocain 20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:80.000	50 cartucce da 1,8 ml	Per interventi di lunga durata, nei casi in cui è richiesto un controllo del sanguinamento locale in chirurgia odontoiatrica