

Nella gestione dei disturbi parodontali



PAROEX

**Massima
Efficacia**

già con 0,12% di CHX



**Minimi effetti
collaterali**

**PROTEZIONE GENGIVALE SUPERIORE
CLINICAMENTE DIMOSTRATA**

L'AVANZATO SISTEMA ANTIBATTERICO A DOPPIA AZIONE PER UNA PROTEZIONE GENGIVALE SUPERIORE



**SUPERIORE EFFICACIA
DIMOSTRATA CLINICAMENTE¹⁰**
Collutorio 0,12% CHX + 0,05% CPC

La linea **GUM® Paroex®** associa l'efficacia clinicamente dimostrata della clorexidina digluconato (CHX) all'**azione tossina-neutralizzante** del cetilpiridinio cloruro (CPC), garantendo un **Sistema Antisettico a Doppia Azione avanzato**, mirato sia sui **batteri della placca** che sulle loro **endotossine**, per una protezione completa contro le **malattie gengivali**.

CHX

CPC

Sistema Antisettico a Doppia Azione

CHX^{3,4,5}: garantisce l'eliminazione dei batteri della placca grazie alla sua azione antibatterica ad ampio spettro.

CPC^{6,7,8}: lega e rimuove i lipopolisaccaridi proinfiammatori tossici dei batteri, liberati durante l'azione antibatterica.

CPC accresce il potere antibatterico di CHX:

così le concentrazioni più basse della nuova formulazione di GUM® Paroex® offrono un'efficacia analoga a quella dei prodotti a concentrazione più alta contenenti la sola CHX⁹, causando minori effetti indesiderati.

**CONTROLLO SUPERIORE
DELLA PLACCA CON GUM® PAROEX®**


SUNSTAR



PAROEX[®]

3 LIVELLI DI INTENSITÀ TERAPEUTICA DI CHX

Per una protezione gengivale superiore durante l'intero ciclo di trattamento parodontale.



CONTROLLO SUPERIORE DELLA

PER UNA MIGLIORE COMPLIANCE DEL PAZIENTE

GUM® Paroex® è la linea di prodotti *patient-friendly*

- **Sapore più gradevole** rispetto agli altri principali collutori con CHX per una superiore fedeltà al piano di trattamento.
- Non produce sensazioni di bruciore o di pizzicore ed è delicato sui tessuti orali perché **non contiene alcol**.
- **Pronta all'uso**, il collutorio non richiede diluizione.

**SUPERIORE EFFICACIA
DIMOSTRATA CLINICAMENTE¹⁰**
Collutorio 0,12% CHX + 0,05% CPC



*rispetto ad altri principali collutori a base di CHX

GUM® Paroex® è dalla parte delle gengive:

Il gel per il trattamento temporaneo e il dentifricio per la prevenzione quotidiana:

- contengono **vitamina E**, un antiossidante che riduce l'invecchiamento cellulare e mantiene sane le gengive
- contengono **Aloe vera**, che nutre e allevia l'irritazione dei tessuti orali
- contengono **pro-vitamina B5**, agente tonico e rivitalizzante della mucosa orale
- sono privi di agenti schiumogeni anionici per un'azione delicata sulla mucosa orale.

Il dentifricio per la prevenzione quotidiana contiene inoltre:


- 1450 ppm di **ioni fluoruro**, che aiutano a rinforzare i denti e proteggerli dalla carie.

1. Wolf HF, Hassell TM. Color atlas of dental hygiene: Periodontology. New York: Thieme Medical Publishers, 2009. 2. Page RC, Kornman KS. The pathogenesis of human periodontitis: an introduction. Periodontol 2000 1997; 14: 9-11. 3. Charles CH, Mostler KM, Bartels LL, Mankodi SM. Comparative antiplaque and antigingivitis effectiveness of a chlorhexidine and an essential oil mouthrinse: 6-month clinical trial. J Clinical Periodontol 2004; 31(10): 878-884. 4. Addy M, Sharif N, Moran J. A non-staining chlorhexidine mouthwash? Probably not: a study in vitro. Int J Dent Hygiene 2005; 3(2): 59-63. 5. Lorenz K, Bruhn G, Heumann C et al. Effect of two new chlorhexidine mouthrinses on the development of dental plaque, gingivitis, and discolouration. A randomized, investigator-blind, placebo controlled, 3-week experimental gingivitis study. J Clin Periodontol 2006; 33: 561-567. 6. Panda K, Chakraborty AK. Interaction of mixed surfactants with bacterial lipopolysaccharide. J Coll and Interf Sci 1998; 203(2): 260-264. 7. Stookey GK, Beiswanger B, Mau M et al. A 6-month clinical study assessing the safety and efficacy of two cetylpyridinium chloride mouthrinses. Am J Dent 2005; 18:24A-28A. 8. Haps S, Slot DE, Berchier CE, Van der Weijden GA. The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. Int J Dent Hygiene 2008; 6: 290-303. 9. Data on file. 10. Per Ramberg et al. Effect Of Chlorhexidine/Cetylpyridinium Chloride On Plaque And Gingivitis: Abstract ID# 182859 IADR WCPD Budapest 2013.


I BATTERI NON SONO GLI UNICI RESPONSABILI DELLE PROBLEMATICHE PARODONTALI

Quando i batteri vengono distrutti e disgregati, liberano tossine proinfiammatorie note come **lipopolisaccaridi (LPS)**.

Queste, in associazione con altri fattori di rischio (fumo, stress, ecc.), possono svolgere un ruolo determinante nella malattia parodontale.¹



LPS liberati dai batteri distrutti all'interno della bocca



Per questo eliminare i batteri patogeni NON BASTA



PAROEX[®]

UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI CON **SISTEMA ANTISETTICO A DOPPIA AZIONE** PER LE ESIGENZE DI SUPERIORE PROTEZIONE GENGIVALE DI TUTTI I TUOI PAZIENTI

CHX 0,20%

Indicato prima/dopo interventi di chirurgia, impianti ed estrazioni dentarie.

CHX 0,12% + CPC 0,05%

Da usare nella pratica clinica per il trattamento di pazienti con gengivite/parodontite, e da raccomandare per il trattamento temporaneo domiciliare.

CHX 0,06% + CPC 0,05%

Da raccomandare ai pazienti per il controllo domiciliare della placca, per prevenire la ricomparsa di problemi gengivali.



*rispetto ad altri principali colluttori a base di CHX



**SUPERIORE EFFICACIA
DIMOSTRATA CLINICAMENTE¹⁰**
Collutorio 0,12% CHX + 0,05% CPC



Collutorio, Gel e Dentifricio

Seguici su



Sunstar Italiana Srl

Numero Verde
800-580840

www.SunstarGUM.it
info.italy@it.sunstar.com

SUNSTAR

